Slovenščina

Informacije za pacientko in obrazec za soglasje k medikamentozni prekinitvi nosečnosti z zdraviloma Mifegyne® / Cyprostol®

Datum:

Gospa:

Ulica, hišna številka:

Kraj:

Potrjujem, da me je lečeči zdravnik v celoti seznanil s predvideno medikamentozno prekinitvijo nosečnosti z zdraviloma Mifegyne® in Cyprostol® (zlasti glede spodaj navedenih točk). Nimam dodatnih vprašanj.

Medikamentozna prekinitev nosečnosti:
Zdravilo Mifegyne® vsebuje antiprogestogen mifepriston, ki zavira delovanje progesterona.
Progesteron je hormon, potreben za vzdrževanje nosečnosti. Zdravilo Mifegyne® se zato uporablja za sprožitev prekinitve nosečnosti. Prav tako zmehča in odpre maternični vrat (vhod v maternico).
Zdravilo Cyprostol® (uporaba izven odobrene indikacije): spodbuja krčenje maternične mišic in mehča maternični vrat. Zato se pri prekinitvah nosečnosti pogosto uporablja v kombinaciji z zdravilom Mifegyne®.

Seznanjena sem, da se postopek prekinitve nosečnosti začne takoj po zaužitju zdravila Mifegyne® in ga ni mogoče razveljaviti.

• Seznanjena sem, da zdravljenje v redkih primerih (približno 15 %) morda ne bo uspešno ali pa bo nepopolno. V takšnih primerih bo morda treba prekinitev nosečnosti dokončati z naknadno kiretažo (kirurškim posegom) ali z dodatnim odmerkom prostaglandina. • Seznanjena sem z možno alternativno metodo – kirurško prekinitvijo nosečnosti z vakuumsko aspiracijo ali kiretažo – in podrobno so mi bile predstavljene prednosti ter slabosti obeh metod.

• Če se nosečnost kljub zaužitju zdravil nadaljuje in se odločim, da jo bom donosila, se zavedam, da tveganj za zdravje ploda ni mogoče izključiti in da je potreben natančen nadzor nosečnosti.

Postopek zdravljenja: Medikamentozna prekinitev intrauterine nosečnosti do 9. tedna in 0 dni (9+0) gestacije se izvede z zaužitjem 600 mg zdravila Mifegyne® v tej ustanovi, čemur 48 ur kasneje sledi uporaba 4 tablet zdravila Cyprostol® (dve tableti naj se raztopita v ustih, dve pa se vstavita globoko v nožnico).
Razumem, kdaj in kako se uporabljata ti dve (različni) zdravili. Dunaj
(Ordinacijski) žig **Podpis pacienta**

Čeprav se zdravili Mifegyne® in Cyprostol® na splošno dobro prenašata, se lahko v redkih primerih pojavijo neželeni učinki. Najpogostejši neželeni učinki so slabost, bruhanje, driska, krčenje maternice, krči, okužba po splavu in močna krvavitev (ki se pojavi v približno 5 % primerov). V primeru vztrajnih simptomov je priložen recept za zdravljenje neželenih učinkov. Za podrobnejše informacije preberite navodilo za uporabo zdravila.
Če simptomi vztrajajo ali se pojavi močna krvavitev, pokličite nujno medicinsko pomoč ali obiščite najbližjo urgenco.

• Seznanjena sem, da se lahko po zaužitju oziroma uporabi zdravil pojavijo neželeni učinki.
Obveščena sem bila o tem, kateri so lahko ti neželeni učinki, kaj lahko storim v zvezi z njimi
in v katerih primerih se moram nemudoma posvetovati z zdravnikom.

Poleg tega potrjujem, da ne vem za nobeno preobčutljivost na učinkovino ali druge sestavine zdravila in da ne trpim za nobenim od naslednjih
stanj:

• Kronična odpoved nadledvične žleze
• Huda, nenadzorovana astma
• Dedna porfirija
• Odpoved jeter ali ledvic

S tem potrjujem, da se bom približno 2 tedna po zdravljenju udeležila kontrolnega pregleda v ordinaciji.

Kraj, datum Podpis pacientke

S tem potrjujem, da je dr. Franz Wierrani z mano opravil posvet in mi pojasnil postopek. Poleg tega potrjujem, da sem prebrala in razumela te informacije za pacientke ter obrazec za privolitev in da nimam dodatnih vprašanj.
Zato izrecno soglašam z medicinskim splavom.

Kraj, datum Podpis pacientke

Podpis zdravnika