Magyar

Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat Mifegyne® / Cyprostol® készítményekkel végzett gyógyszeres terhességmegszakításhoz

Dátum:

Hölgy neve:

Utca, házszám:

Város/település:

Ezennel igazolom, hogy kezelőorvosom teljes körűen tájékoztatott a Mifegyne® és Cyprostol® alkalmazásával történő, tervezett gyógyszeres terhességmegszakításról (különösen az alábbi pontok tekintetében). További kérdésem nincs.

Gyógyszeres terhességmegszakítás:
A Mifegyne® hatóanyaga a mifepriszton (egy antiprogesztogén), amely gátolja a progeszteron hatását.
A progeszteron a terhesség fenntartásához szükséges hormon. A Mifegyne®-t ezért a terhesség megszakításának előidézésére alkalmazzák. Emellett a méhnyak (a méhszáj) felpuhítására és megnyitására is szolgál.
Cyprostol® (engedélytől eltérő, ún. „off-label" alkalmazás): serkenti a méhizomzat működését és felpuhítja a méhnyakat. Ezért gyakran alkalmazzák a Mifegyne®-nel kombinálva terhességmegszakítás céljából.

Tudomásul veszem, hogy a terhességmegszakítás folyamata közvetlenül a Mifegyne® bevételét követően megkezdődik, és nem fordítható vissza.

• Tájékoztattak arról, hogy ritka esetekben (kb. 15%) előfordulhat, hogy a kezelés nem hatásos, vagy a folyamat nem teljes körű. Ilyenkor szükségessé válhat a terhességmegszakítás befejezése utólagos kürettázs (sebészeti beavatkozás) vagy egy második, alternatív prosztaglandin-adag alkalmazása révén. • Tájékoztattak a lehetséges alternatív módszerről – nevezetesen a vákuumaszpirációval vagy kürettázzsal végzett sebészeti beavatkozásról –, és részletesen megbeszéltük mindkét módszer előnyeit és hátrányait.

• Amennyiben a terhesség a gyógyszer bevételét követően is fennmarad, és úgy döntök, hogy kihordom a terhességet, tudomásul veszem, hogy a magzatot érintő egészségügyi kockázatok nem zárhatók ki, és a terhességet szoros orvosi megfigyelés alatt kell tartani.

Kezelési eljárás: A méhen belüli terhesség gyógyszeres megszakítása a terhesség 9+0. hetéig úgy történik, hogy az intézményben 600 mg Mifegyne®-t veszek be, majd 48 órával később 4 szem Cyprostol®-t alkalmazok (2 szemet a szájban hagyok feloldódni, 2 szemet pedig mélyen a hüvelybe helyezek fel).
Megértettem, mikor és hogyan kell alkalmazni a két (különböző) gyógyszert. Bécs
(Praxis)bélyegző A páciens aláírása

Bár a Mifegyne® és a Cyprostol® általában jól tolerálható, ritka esetekben mellékhatások jelentkezhetnek. A leggyakoribb mellékhatások közé tartozik az émelygés, hányás, hasmenés, méhösszehúzódások, görcsök, a beavatkozást követő fertőzés, valamint az erős vérzés (amely az esetek körülbelül 5%-ában fordul elő). Tartós tünetek esetén a mellékhatások kezelésére szolgáló gyógyszerre vonatkozó receptet mellékeljük. Kérjük, a részletekért olvassa el a betegtájékoztatót.
Tartós tünetek vagy erős vérzés esetén hívja a mentőket, vagy keresse fel a legközelebbi kórház sürgősségi osztályát.

• Tudomásul veszem, hogy a gyógyszerek alkalmazását követően nemkívánatos mellékhatások jelentkezhetnek.
Tájékoztattak arról, hogy mik lehetnek ezek a mellékhatások, mit tehetek ellenük,
és milyen esetekben kell azonnal orvoshoz fordulnom.

Továbbá megerősítem, hogy nem áll fenn nálam túlérzékenység a gyógyszer hatóanyagával vagy egyéb
összetevőjével szemben, valamint hogy nem szenvedek az alábbi
betegségek egyikében sem:

• Krónikus mellékvese-elégtelenség
• Súlyos, nem megfelelően kontrollált asztma
• Örökletes porfíria
• Máj- vagy veseelégtelenség

Ezennel megerősítem, hogy a kezelést követően körülbelül 2 héttel megjelenek az ellenőrző vizsgálaton a rendelőben.

Helyszín, dátum A páciens aláírása

Ezennel megerősítem, hogy Dr. Franz Wierrani konzultációt folytatott velem az eljárás ismertetése céljából. Továbbá megerősítem, hogy elolvastam és megértettem ezt a betegtájékoztatót és a beleegyező nyilatkozatot, és nincsenek további kérdéseim.
Ennek megfelelően kifejezetten hozzájárulok a gyógyszeres abortusz elvégzéséhez.

Helyszín, dátum A páciens aláírása

Az orvos aláírása